

Directions for using C-GEL

- (1) Wear Protective gloves to remove contaminated clothing.
- (2) Irrigate skin with high flow water for a maximum of 1 minute or alternative decontaminant solution.
- (3) Remove tube cap and seal.
- (4) Apply C-gel liberally to burn and surrounding area, using appropriate gloves.
- (5) Massage into skin for 15 minutes after the pain is relieved, re-applying gel as required.
- (6) Transfer patient to hospital, continuing treatment.

For external use only · Do not use in eyes · Keep out of reach of children · Discard open tubes after use · Store above 8°C and below 25°C ·
Do not use after expiry date shown above · The product should not be applied on open wounds

Gel de Gluconate de Calcium

Mode d'emploi du C-Gel

- (1) Porter des gants de protection pour enlever les vêtements souillés.
- (2) Décontaminer la peau avec de l'eau à haut débit pendant maximum 1 minute ou utiliser une autre solution de décontamination appropriée.
- (3) Retirer le bouchon et le joint d'étanchéité du tube.
- (4) Appliquer C-Gel sur et autour de la surface contaminée, porter des gants appropriés.
- (5) Masser pendant 15 minutes afin de faire pénétrer le gel une fois la douleur soulagée, réutiliser autant de gel que nécessaire.
- (6) Transférer le patient à l'hôpital, continuer le traitement.

Pour usage externe uniquement · Ne pas utiliser dans les yeux · Garder hors de la portée des enfants ·
Jeter les tubes ouverts après usage · Conserver entre 8°C et 25°C · Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée ci-dessus ·
Ce produit ne doit pas être utilisé sur des plaies ouvertes

Calciumgluconat-Gel

Gebrauchsanweisungen für C-GEL

- (1) Schutzhandschuhe tragen, um die mit der Chemikalie in Kontakt gekommene Kleidung zu entfernen.
- (2) Die Haut maximal 1 Minute lang unter fließendem Wasser spülen oder andere Dekontaminierungsmethoden anwenden.
- (3) Entfernen Sie den Verschluss und die Schutzflasche.
- (4) C-GEL auf und um die betroffene Stelle herum auftragen, geeignete Handschuhe tragen.
- (5) 15 Minuten lang einmassieren. Nachdem der Schmerz nachgelassen hat, Gel nach Bedarf wieder auftragen.
- (6) Einen Arzt zur weiteren medizinischen Behandlung aufsuchen.

Nur für die äußere Anwendung · Nicht in den Augen anwenden · Außer Reichweite für Kinder aufbewahren.
Geöffnete Tuben nach Gebrauch entsorgen · Zwischen 8°C und 25°C lagern ·
Nicht nach Ablauf des angegebenen Haltbarkeitsdatums verwenden · Nicht auf offenen Wunden anwenden ·

Gel de gluconato cálcico

Recomendaciones para el uso del C-Gel

- (1) Llevar guantes de protección para retirar la ropa contaminada.
- (2) Descontaminar la piel con agua durante máximo 1 minuto u otra solución de descontaminación
- (3) Quitar la tapa del tubo y la junta
- (4) Aplicar C-Gel sobre y alrededor de la quemadura, llevando guantes apropiados.
- (5) Masajear sobre la piel durante 15 minutos después del cese del dolor, reutilizar gel si es necesario
- (6) Trasladar al paciente al hospital, continuando con el tratamiento

Sólo para uso externo · No usar en los ojos · Mantener fuera del alcance de los niños · Tirar los tubos abiertos después de la utilización ·
Almacenar a más de 8°C y menos de 25°C · No usar después de la fecha de caducidad arriba indicada · No utilizar sobre heridas abiertas